

## Odlarbrief v. 24

- Dags att bekämpa stritar
- Bladmögelprognos
- Kvävekomplettering

### Insekter

Efter en tydlig inflygningstopp förra veckan är det nu aktuellt med bekämpning av stritar. Optimal tidpunkt för första behandling är ca 14 dagar efter påbörjad inflygning eller ca 7 dagar efter inflygningsmax. Detta för att förhindra äggläggning och utveckling av en ny generation.

Ort	Stritar/dygn	
	vecka 23	vecka 24
Östra Ljungby	11,2 st	0,6 st
N Åsum	55,8 st	4,0 st
Nymö	13,7 st	1,7 st
Gärds Köpinge	6,7 st	0,6 st
Tollarp	55,2 st	1,4 st
Tollarp	118,8 st	47,1 st
Vittskövle	17,3 st	5,0 st
Degeberga	11,8 st	8,3 st
Sölvesborg	13,2 st	0,1 st
Sölvesborg	112,0 st	0,3 st
Halltorp	51,9 st	6,3 st
Hagby	18,6 st	8,9 st
Ljungbyholm	15,0 st	35,7 st
Vickleby	0,6 st	8,3 st
Kastlösa	1,3 st	6,3 st
Bjärby	0,3 st	1,3 st
Degerhamn	0,8 st	0,4 st
Laholm	34,2 st	1,7 st
Laholm	11,7 st	0,3 st
Ängelholm	10,4 st	6,1 st
Påarp	3,1 st	0,3 st
Kävlinge	3,1 st	0,3 st
Höllviken	0,7 st	0,4 st
Skivarp	29,0 st	3,6 st
Löberöd	10,9 st	1,0 st
Löberöd	13,8 st	26,4 st
Köpingsbro	0,1 st	3,9 st
Glemmingebro	0,0 st	0,1 st
Löderup	0,0 st	1,6 st
Vinslöv	23,1 st	11,1 st
Everöd	6,4 st	0,6 st
Svängsta	15,4 st	13,1 st
Ramdala	43,2 st	2,3 st

### Rekommendation denna vecka: 0,2 I Mavrik.

Undantag är Ljungbyholm, Öland och Österlen. På dessa orter kan man med fördel avvakta en vecka med bekämpning.

Ett fåtal löss hittades i Lyckeby observationsfält vilket är ovanligt tidigt. Inga fält vara dock i närheten av bekämpningströskeln.

### Bladmögel

Bladmögeltrycket var något högt i slutet av maj. Med hjälp av lite lägre temperaturer är bladmögeltrycket just nu lågt på de flesta stationer i odlingsområdet. Planen är att köra första bladmögelbehandlingen om en vecka (ca 17 juni). Skulle infektionstrycket överstiga 40 risktimmar, enligt Skimmelstyring, på din lokala väderstation rekommenderas behandling enligt det program som är utskickat. [Klicka här för att komma till prognosmodellen](#)

I Danmark används "tumregeln" första behandlingen bör utföras om det regionalt har varit 1-2 perioder med hög bladmögelrisk (enligt Skimmelstyring) efter uppkomst eller omedelbart före en period med utsikt till bladmögelväder om det finns bladmögel i regionen.

Just nu finns bara bladmögel rapporterat på Bjäre vilket inte är ovanligt.

## Växtnäring


Potatisen har vuxit kraftigt senaste veckorna och i tidigt satta fält börjar det bli aktuellt att kompletteringsgödsla med kväve. Inför utsädesbeställningen skickades information ut om de olika sorternas kvävebehov.

Lyckeby erbjuder även i år analys av kväve och kalium. Nedan följer en instruktion hur bladen plockas och ett schema över mättillfällena.

### Instruktion

- A) Plocka fjärde bladet uppifrån, ca 25-30 storblad.
- B) Avlägsna småbladen så att endast bladskافتet blir kvar.
- C) Samla bladskافتen (25-30 st) utan småblad och lägg i en plastpåse tillsammans med en lapp med information enligt nedan:

- 1) Odlarnummer
- 2) Namn
- 3) Mailadress
- 4) Fältnamn
- 5) Sort
- 6) Antal dagar efter uppkomst



Viktigt att ovanstående information följer med respektive prov för att vi ska kunna identifiera proven. Analysresultat presenteras senast dagen efter mätningen via mail där man med hjälp av sitt odlarnummer hitta sina mätvärden. **Obs: Vi analyserar endast prover från stärkelsepotatis.**

18	Juni	09:00	Helgegården	<b>Lister: Lämna prov hos Henrik F senast 09:00</b>
25	Juni	10:00	Ingvar Danielsson	<b>Ramdala: Lämna prov hos Jonas F senast 08:30 (flishallen)</b>
4	Juli	09:00	Borgeby Gård	
5	Juli	10:00	Christian Toarp	Adress: Toarp 17, 273 94 Tomelilla
9	Juli	09:00	Helgegården	<b>Lister: Lämna prov hos Henrik F senast 09:00</b>
10	Juli	10:00	Ingvar Danielsson	<b>Ramdala: Lämna prov hos Jonas F senast 08:30 (flishallen)</b>
18	Juli	09:00	Helgegården	<b>Lister: Lämna prov hos Henrik F senast 09:00</b>
19	Juli	10:00	Christian Toarp	Adress: Toarp 17, 273 94 Tomelilla

## Bladgödning

Vid höga pH-värden och lite snål fosforgödning är det just nu aktuellt att bladgödsla med fosfor. Lyckeby har goda försöksresultat av Magnosfoss och rekommendationen är att köra tidigt (potatisen ska vara ca 10-15 cm höga). Dos 10-20 l/ha, upprepa 2-3 gånger med en veckas intervall.

Kom ihåg mangan.

### Hälsningar

Gabriella Malm

[gabriella.malm@lyckeby.com](mailto:gabriella.malm@lyckeby.com)

044-28 61 53

Stefan Hansson

[stefan.hansson@lyckeby.com](mailto:stefan.hansson@lyckeby.com)

044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson

[kristoffer.gustafsson@lyckeby.com](mailto:kristoffer.gustafsson@lyckeby.com)

044-28 61 65